



مرکز آموزشی درمانی شهید بهشتی

راهنمای بیماران

تزریق خون

شماره سند: ED-TA-145



تلفن های بیمارستان: ۰۶-۳۸۳۸۰۷۰۳-۰۸۱

آدرس سایت اینترنتی

<http://beheshti.umsha.ac.ir>

ویرایش ۰۶- بازنگری آذر ۱۴۰۰

اقدامات پس از ایجاد علائم فوق:

بیمار عزیز اگر شما با تزریق خون دچار علائم مذکور شدید، با کمال خونسردی و حفظ آرامش به پرستار خود با زنگ احضار پرستار اطلاع دهید و مابقی اقدامات را با اعتماد کامل به ایشان موکول کنید. در برخی موارد بنا به صلاحدید پزشک مابقی خون با نظارت دقیق پرستار تزریق می شود و یا اینکه کیسه خون به آزمایشگاه جهت بررسی های بیشتر عودت داده می شود

خون تو زندگی رابه من هدیه داد
متشکرم



تهیه کننده: واحد آموزش سلامت

مشاور علمی: گروه داخلی- قلب

منبع:

Clinical Guide To Transfusion; Canadian Blood Service; July 2006.

عوارض احتمالی ناشی از تزریق کیسه های خون شامل موارد ذیل می باشد:

- ✓ تب
- ✓ درد قفسه سینه
- ✓ درد کمر
- ✓ درد عضلانی
- ✓ سر درد
- ✓ احساس گرما در محل تزریق یا در طول رگ
- ✓ گزگز اندامها
- ✓ سرفه
- ✓ تهوع و استفراغ
- ✓ درد شکم
- ✓ خارش پوست
- ✓ ایجاد لکه های قرمز روی سطح پوست یا همان کهیر

خون چیست؟

خون مایع قرمز رنگ جاری در رگهای کل سطح بدن می باشد که وظیفه ی اصلی آن رساندن اکسیژن بوده و حاوی سلولهای خونی و پلاسما می باشد.



یکی از این سلولهای خونی سلولهای قرمز رنگ می باشد .
وزمانی که از خون طی فرایندی جدا شود خون زرد رنگ شده و دیگر قرمز نیست .

انواع فرآورده های خونی:

با توجه به مطالب فوق، کیسه های خونی که جهت بیماران مورد استفاده قرار می گیرد ممکن است قرمز یا زرد رنگ باشد، کیسه های قرمز رنگ، کیسه های PC یا سلولهای فشرده نام دارد که حاوی RBC می باشد.

کیسه های P.C در بیمارانی که مشکل کم خونی دارند طبق صلاحدید پزشک معالج مورد استفاده قرار می گیرد



سایر فرآورده های خونی زرد رنگ در سه نوع FFP، کرایو، پلاکت هر کدام متناسب با وضعیت بیمار و نیز صلاحدید پزشک معالج مورد استفاده قرار می گیرد.



عوارض احتمالی ناشی از تزریق کیسه های خون:

به ندرت در برخی موارد به دنبال تزریق خون بیمار دچار علائمی می شود که نشانه حساسیت بدن شما به خونی است که در حال تزریق است.